

# What You Need to Know About Monkeypox (MPX)



## What is MPX?

MPX is a rare, but potentially serious illness that can be spread from person to person through direct contact with bodily fluids or MPX rash.

## What are the symptoms of MPX?



Photo Credit:  
UK Health Security Agency

- Painful skin rash
- Fever
- Headache
- Muscle aches
- Swollen Lymph Nodes

Symptoms usually appear 7–14 days after exposure.



Photo Credit:  
UK Health Security Agency




Photo Credit: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

## What if I think I have MPX?

You should see your usual healthcare provider or visit an urgent care.

## How do I get MPX?



MPX spreads between people primarily through direct contact with infectious sores, scabs, or bodily fluids. MPX can spread during intimate contact between people, including sex, kissing, hugging, or talking closely; and touching fabrics and objects that were used by a person with MPX, such as bedding and towels. It can also be spread through coughing or saliva from a person with MPX.

## How can I prevent MPX?

- Avoid intimate contact with people recently diagnosed or who recently may have been infected.
- Be aware that MPX is spreading among people with multiple sex partners.
- Wear a face mask if you are in close contact with someone who has symptoms.
- Wash your hands with soap and water or use hand sanitizer, especially after coming into contact with those who are infected—or suspected infected.

**For more information on MPX, please visit:**

[scdhec.gov/MPX](https://scdhec.gov/MPX)

[cdc.gov/monkeypox](https://cdc.gov/monkeypox)

# Lo que debe saber acerca de la viruela del mono (MPX)



## ¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono (Monkeypox, MPX) es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave que puede propagarse de persona a persona a través del contacto directo con fluidos corporales o sarpullidos por la MPX.

## ¿Cuáles son los síntomas de la MPX?



autor de la foto:  
UK Health Security Agency

- Sarpullido doloroso en la piel
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Inflamación de ganglios linfáticos

Los síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición.



autor de la foto:  
UK Health Security Agency



autor de la foto: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

## ¿Qué debo hacer si creo que tengo la MPX?

Debe visitar a su proveedor de atención médica habitual o acudir a un centro de atención de urgencia.

## ¿Cómo contraigo la MPX?



La MPX se propaga entre las personas principalmente a través del contacto directo con llagas o costras infecciosas, o fluidos corporales. La MPX se puede propagar durante el contacto íntimo entre las personas, incluidas las relaciones sexuales, los besos, los abrazos o las conversaciones de cerca; y tocando

telas u objetos que utilizó una persona con MPX, como ropa de cama y toallas. También se puede propagar a través de la tos o la saliva de una persona con MPX.

## ¿Cómo prevenir la MPX?

- Evite el contacto íntimo con personas diagnosticadas recientemente o que puedan haberse infectado hace poco.
- Sepa que la MPX se está propagando entre personas con varias parejas sexuales.
- Utilice una mascarilla si tiene contacto cercano con alguien que presenta síntomas.
- Lávese las manos con agua y jabón o utilice desinfectante para las manos, especialmente después de estar en contacto con personas infectadas (o con sospecha de infección).

Para obtener más información sobre la MPX, visite el siguiente sitio:

[sdc.hcc.gov/MPX](https://sdc.hcc.gov/MPX)

[cdc.gov/monkeypox](https://cdc.gov/monkeypox)